

**GLIOTEN®**

Comprimidos

**Inhibidor de la ECA****Antihipertensivo, vasodilatador  
(Enalapril)****COMPOSICIÓN**

GLIOTEN 2.5: Maleato de enalapril 2.5 mg.

GLIOTEN 5: Maleato de enalapril 5 mg.

GLIOTEN 10: Maleato de enalapril 10 mg.

GLIOTEN 20: Maleato de enalapril 20 mg.

**INDICACIONES:** Hipertensión esencial, hipertensión renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva.**POSOLOGÍA:** La dosis usual diaria varía de 10 a 40 mg en todas las indicaciones, administrada en una o dos tomas, esta dosis debe ajustarse según las necesidades del paciente. La máxima dosis estudiada en el hombre es de 80 mg al día.**HIPERTENSIÓN:** La dosis inicial recomendada es de 5 mg (2.5 mg en la hipertensión renovascular y en pacientes de 65 años o más). La dosis usual de mantenimiento es de un comprimido de 20 mg una vez al día. En hipertensos tratados con diuréticos, la dosis inicial de GLIOTEN debe ser baja (2.5 a 5 mg).**INSUFICIENCIA CARDIACA:** La dosis inicial de GLIOTEN es de 2.5-5 mg y se debe administrar bajo estricta supervisión médica. Si es posible, debe reducirse la dosis de diuréticos antes de iniciar el tratamiento. La dosis usual de mantenimiento es de 10 a 20 mg, administrados en dosis únicas o divididas, esta dosis debe alcanzarse por incrementos graduales tras la dosis inicial y puede llevarse a cabo en un periodo de 2 a 4 semanas.

**CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Pacientes con hipersensibilidad a este fármaco.

Empleo en el embarazo y en madres lactantes: existe un riesgo potencial de hipotensión fetal, bajo peso al nacer y descenso de la perfusión renal en el feto tras la exposición uterina a los inhibidores del enzima de conversión.

Enalapril se excreta por la leche materna.

GLIOTEN no se ha estudiado en niños.

**INTERACCIONES:** Generalmente no se recomienda la utilización de suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de éste, ya que pueden producirse elevaciones significativas.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** GLIOTEN es generalmente bien tolerado. Los efectos secundarios más descritos fueron sensación de inestabilidad, cefalea y tos seca persistente.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:** Información toxicológica a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

### **PRESENTACIONES**

GLIOTEN 2.5 **comprimidos**. Caja por 30 comprimidos.

GLIOTEN 5 **comprimidos ranurados**. Caja por 30 comprimidos.

GLIOTEN 10 **comprimidos biranurados**. Caja por 30 comprimidos.

GLIOTEN 20 **comprimidos biranurados**. Caja por 30 comprimidos.

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

### **LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.**

Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: [dmedica@bago.com.ec](mailto:dmedica@bago.com.ec)

[www.bago.com.ec](http://www.bago.com.ec)

