

INCORIL®

Comprimidos

Antagonista del calcio

Antihipertensivo, antianginoso, antiarrítmico

(Diltiazem)

COMPOSICIÓN

INCORIL 60: Diltiazem 60 mg.

INCORIL MONODOSIS 180: Diltiazem 180 mg.

INCORIL AP (Acción prolongada) 90: Diltiazem 90 mg.

INCORIL AP (Acción prolongada) 120: Diltiazem 120 mg.

INDICACIONES: Angor de esfuerzo y decúbito. An-gor vasoespástico. Tratamiento de las secuelas angino-sas post-infarto. Tratamiento del infarto sin onda Q. Tratamiento de la hipertensión arterial ligera a mode-rada. Profilaxis de las taquicardias paroxísticas supra-ventriculares, después del tratamiento por vía intravenosa. Control de pacientes con «flutter» y/o fi-brilación auricular crónica, excepto cuando se asocien a la existencia de vías accesorias de conducción.

POSOLOGÍA

Hipertensión: el tratamiento de la hipertensión leve deberá iniciarse con 1 comprimido de INCORIL MONODOSIS 180 1 vez al día. La dosis puede ser ingerida en cualquier momento del día, pero se aconseja que cada paciente la tome siempre a la misma hora.

CONTRAINDICACIONES: Síndrome del nódulo sinusal enfermo y/o bloqueo A-V avanzada. Insuficiencia cardiaca severa. Bradicardia importante (frecuencia cardiaca inferior a 55 latidos/minuto). Hipotensión (sistólica menor de 90 mmHg). No se administrará a mujeres gestantes o capaces de serlo, ni en periodo de lactancia y en casos de insuficiencia renal o hepática de carácter grave.



INTERACCIONES Y PRECAUCIONES: Se aconseja prudencia al asociarlo con otros hipotensores y betabloqueantes.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Ocasionalmente pueden presentarse discretas pirosis y malestar gástrico. Se ha informado elevaciones pasajeras de las amino-transferasas.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Información toxicológica a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

PRESENTACIONES

INCORIL 60: caja por 60 **comprimidos**.

INCORIL MONODOSIS 180: caja por 30 **comprimidos**.

INCORIL AP 90: caja por 30 **comprimidos**.

INCORIL AP 120: caja por 30 **comprimidos**.

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.

Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec

