

## **BAGOHEPAT®**

Ácido Dehidrocólico – Cynara scolymus  
Comprimidos Recubiertos

### DIGESTIVO HEPATOPROTECTOR

Lea detenidamente esta información

#### Fórmula:

Cada Comprimido Recubierto contiene: Ácido Dehidrocólico 100 miligramos; Extracto Seco (estandarizado) de Cynara scolymus 100 miligramos. Excipientes: Metilparabeno; Ahídrido Silícico Coloidal; Carboximetil Almidón; Celulosa Microcristalina; Estearato de Magnesio; Amarillo de Quinolina; Verde S; Mentol; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Triacetina; Lactosa.

Bagóhepat es una combinación de dos sustancias: su principal componente activo es de origen natural vegetal, extraído de las hojas de Cynara scolymus (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como hepatoprotector, colerético (aumenta la cantidad de bilis) y colagogo (facilita su pasaje al tubo digestivo) y se ha complementado su fórmula con el Ácido Dehidrocólico, un ácido biliar que aumenta la fluidez de la bilis, ayudando al proceso digestivo. El resultado de un producto con capacidad para estimular las funciones hepato-biliares.

¿En qué casos utilizar Bagóhepat?

Trastornos hepato-vesiculares con manifestaciones de pesadez estomacal, ocasionados por comer en exceso o tomar alimentos ricos en grasa.



## **POSOLOGÍA:**

Adultos y niños mayores de 6 años: 1 a 2 comprimidos antes, durante o después de las comidas.

Modo de Administración:

Ingerir sin masticar, con un poco de líquido (agua, jugo, leche).

Acción Terapéutica:

Digestivo. Hepatoprotector.

**CONTRAINDICACIONES:** No utilizar en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales o enfermedad hepática grave.

Precauciones y advertencias

Precauciones: Antes de utilizar Bagóhepat Comprimidos Recubiertos, consulte a su médico en los siguientes casos:

- Si Usted está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de lactar.

Si conoce o sospecha que padece trastornos en hígado y/o riñón.

Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier medicamento.

Advertencias especiales y precauciones de uso: En caso de ingerir Bagóhepat Comprimidos Recubiertos para aliviar molestias digestivas y que las mismas persistan o empeoren, consultar al médico inmediatamente, especialmente si se trata de dolor. No aguardar más de 5 días sin consulta médica.

Efectos Indeseables: A la dosis recomendada, el medicamento es generalmente bien tolerado, los ácidos biliares a las dosis usuales no producen mayores trastornos, los cuales pueden ser gastrointestinales o hepáticos.



### **USO PEDIÁTRICO:**

Hasta el presente no se establecieron niveles de seguridad y eficacia del uso de Bagóhepat en niños menores de 6 años.

Uso en Embarazo y Lactancia:

Embarazo: No existen datos clínicos acerca de la seguridad de uso en embarazadas.

Lactancia: No existen datos clínicos acerca de la seguridad de uso en mujeres en período de lactancia.

### **SOBREDOSIFICACIÓN:**

No se han reportado casos de sobredosis.

Ante la ingestión accidental por niños pequeños, acudir al Centro de Salud más cercano.

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN CONSULTE A SU MÉDICO.

### **PRESENTACIONES:**

Envases conteniendo 20 Comprimidos Recubiertos.

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Mantener en su envase original.



**TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento Bagóhepat no debe administrarse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

**LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.**

Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: [dmedica@bago.com.ec](mailto:dmedica@bago.com.ec)

[www.bago.com.ec](http://www.bago.com.ec)

