

### **BAGOVITAL DIGEST**

Complemento alimenticio a base de prebióticos

Sobres de 2 g de polvo

Sabor neutro.

### **BAGOVITAL INMUNE**

Complemento alimenticio a base de prebióticos y probióticos

Sobres de 1,5 g de polvo

Aroma a vainilla

### **BAGOVITAL DIGEST**

#### **COMPOSICIÓN:**

Es un complemento de bacterias probióticas, de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, que ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal, favoreciendo el desarrollo del sistema inmune.

<b>COMPONENTES</b>	<b>En 1 porción = 1 sobre</b>
<b>PROBIOTICOS</b>	<b>Mg/UFC</b>
Lactobacillus rhamnosus	8,7mg (1.32 x 10 <sup>9</sup> UFC)
Bifidobacterium infantis	3,27mg (0,5 x 10 <sup>9</sup> UFC)
Bifidobacterium lactis	3,27mg (0,5 x 10 <sup>9</sup> UFC)
Bifidobacterium bifidum	3,27mg (0,5 x 10 <sup>9</sup> UFC)
Bifidobacterium longum	3,27mg (0,5 x 10 <sup>9</sup> UFC)
Dextrosa	276,25
Estearato de Mg	1.50



Ácido Ascórbico	0,09
Energía Kcal	8,000
Hidratos de Carbono disponibles (g)	0,002
Proteínas (g)	0,010
Grasa total (g)	0,012
Sodio (g)	0,002

Productos libres de Azúcar  
Productos libres de Gluten

## INDICACIONES

Es tan seguro que está indicado incluso en lactantes

- durante periodos diarreicos de diferente origen, Rotavirus y/o tratamiento antibiótico.
- Su uso continuado, ayuda a restaurar la flora intestinal favoreciendo la asimilación de nutrientes y el correcto desarrollo del sistema inmune.
- Cólicos y dolor abdominal

En niños y adultos en todas aquellas situaciones que precisan un reequilibrio de la flora bacteriana intestinal, como diarreas o gastroenteritis, y tras un tratamiento antibiótico.



## **MECANISMO DE ACCIÓN:**

- Inhibición competitiva contra bacterias patógenas
- Reduce el pH en el medio evitando que las bacterias patógenas proliferen.
- Inhibición de la adherencia de las bacterias patógenas
- Secreción de bacteriocinas llamadas lantibioticos
- Incrementa la producción benéfica de moco

## **POSOLOGIA**

Administrar el contenido de un sobre disuelto en 50 ml de agua, leche o yogurt 1 o 2 veces al día, durante el proceso infeccioso o tras tratamiento antibiótico. No administrar con líquidos calientes.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Pacientes con historia de hipersensibilidad a alguno de sus componentes

## **PRESENTACIONES:**

Envase conteniendo 10 sachet de 2 g de polvo.



## BAGOVITAL INMUNE

### COMPOSICIÓN:

Es un simbiótico; complemento de Pre-biótico FOS y Probióticos (bacterias prebióticas, de los géneros *Lactobacillus acidophilus* Rosell-52, *Bifidobacterium infantis* Rosell -33, *Bifidobacterium bifidum* Rosell-71) y vitamina C.

COMPONENTES	En 1 porción = 1 sobre
Probióticos <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lactobacillus acidophilus</i> Rosell-52</li> <li>• <i>Bifidobacterium infantis</i> Rosell -33</li> <li>• <i>Bifidobacterium bifidum</i> Rosell-71</li> </ul>	105mg (5x10 <sup>9</sup> UFC)
Prebióticos Fructosa-oligosacáridos	750mg
Vitamina C	16,8mg (12mg )
Aroma a vainilla	75
Almidón	553,2
Energía (Kcal)	3
Hidratos de Carbono disponibles (g)	3
Grasa total (g)	0,004
Sodio	0,003
Peso total	1,5 g



## **Productos libres de Azúcar**

### **Productos libres de Gluten**

#### **INDICACIONES**

- Favorecen el funcionamiento del sistema inmunológico
- Restablece el equilibrio de la flora intestinal.
- Gran utilidad en la diarrea asociada con antibióticos (AAD),
- Síndrome de intestino irritable
- Mejorar la tolerancia a los productos lácteos

#### **MECANISMO DE ACCIÓN:**

##### **FOS:**

•Ingredientes alimenticios no digeribles por el intestino que nutren y estimulan selectivamente el crecimiento y /o actividad metabólica de las bacterias saprofitas mejorando la salud del huésped

##### **PROBIOTICOS**

- Inhibición competitiva contra bacterias patógenas
- Reduce el pH en el medio evitando que las bacterias patógenas proliferen.
- Inhibición de la adherencia de las bacterias patógenas
- Secreción de bacteriocinas llamadas lantibioticos
- Incrementa la producción benéfica de moco

#### **POSOLOGIA:**

Para utilizar, mezclar el contenido de un sachet en un vaso de agua, leche o yogurt. No administrar con líquidos calientes.

Tomar 1 sachet con un vaso con agua junto con las comidas. Máximo 2 porciones al día

Para reforzar inmunidad: 1 sachet por 10 días durante 3 meses



**CONTRAINDICACIONES:**

Pacientes con historia de hipersensibilidad a alguno de sus componentes

**PRESENTACIONES**

Envase conteniendo 10 sachet de 1,5gr de polvo.

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.  
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre,  
Edificio Alto Aragón.  
T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401  
Correo Electrónico: [dmedica@bago.com.ec](mailto:dmedica@bago.com.ec)  
[www.bago.com.ec](http://www.bago.com.ec)

