

Somazina® 500 mg Comprimidos

Citicolina

Vía Oral

Composición

Por comprimido:

Citicolina (D.C.I.) 500 mg

Excipientes: Talco, Estearato de magnesio, Aerosil 200 , carboximetil celulosa sódica, aceite de ricino hidrogenado, celulosa microcristalina, Talco, Estearato de magnesio, Bióxido de titanio, Polietilenglicol 6000, * Eudragit E (12.5%).

Propiedades

Citicolina estimula la biosíntesis de los fosfolípidos estructurales de la membrana neuronal. Citicolina mediante esta acción, mejora la función de los mecanismos de membrana, tales como el funcionamiento de las bombas de intercambio iónico y los receptores insertados en ella, cuya modulación, es imprescindible para una correcta neurotransmisión.

Gracias a su acción estabilizadora de las membranas, la Citicolina posee propiedades antiedematosas cerebrales.

Ensayos clínicos han demostrado que Citicolina mejora los síntomas asociados a estados de disfunción cerebral secundarios a diversos procesos, tales como el traumatismo craneoencefálico y el accidente vascular cerebral agudo. Citicolina mejora el nivel de atención de conciencia, así como actúa favorablemente sobre la amnesia y los trastornos cognitivos, sensitivos y motores asociados a estas patologías.

Indicaciones

Accidentes cerebro-vasculares en fase aguda y subaguda.

Traumatismos craneales recientes y sus secuelas.

Trastornos cognitivos.

Dosificación

1-4 comprimidos al día, dependiendo de la gravedad del cuadro a tratar.

Esta dosis puede incrementarse si el médico lo cree conveniente.

Contraindicaciones

No debe administrarse a pacientes con hipertonia del parasimpático. En caso de alergia conocida al fármaco.

Efectos secundarios

Ocasionalmente, Somazina puede ejercer una acción estimulante del parasimpático, así como un discreto efecto hipotensor pasajero.

Incompatibilidades

No debe administrarse conjuntamente con medicamentos que contengan meclofenoxato.

Interacciones

La Citicolina potencia los efectos de la L-Dopa.

Embarazo y lactancia

Aunque los estudios de animales no han demostrado efectos teratógenos, como no se han realizado pruebas con mujeres embarazadas, se recomienda no administrar el fármaco durante el embarazo a menos que el potencial de beneficio supere al potencial de riesgo.

Intoxicación y posible tratamiento de la misma

Dada la escasa toxicidad del preparado, no se prevé la aparición de intoxicaciones, ni incluso en aquellos casos en que accidentalmente se haya sobrepasado las dosis terapéuticas.

Presentación

Envases con 10 y con 20 comprimidos.

Con receta médica.

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Fabricado por

Ferrer Internacional, S.A.

JOAN BUSCALLA, 1-9,

08173 SANT CUGAT DEL VALLES,

Barcelona - España.